



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage/Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte weiter gegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dasselbe Krankheitsbild haben wie Sie.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg beachten?
3. Wie ist MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg aufzubewahren?

MYOCHOLINE-GLENWOOD®

Tabletten 25 mg



Wirkstoff: Bethanecholchlorid

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Bethanecholchlorid.

1 Tablette enthält 25 mg Bethanecholchlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Calciumsulfatdihydrat, Talkum, Maisstärke.

MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg ist in Packungen mit 50 und 100 Tabletten erhältlich.

1. WAS IST MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg ist ein Cholinergikum.

von: Glenwood GMBH – Postfach 1261, 82302 Starnberg – Riedener Weg 23, 82319 Starnberg
Telefon 0 81 51-9 98 79-0 – Telefax 0 81 51-9 98 79-10

MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg wird angewendet bei:

Erkrankungen, bei denen eine Stimulation (Anregung) des Blasenmuskels angezeigt ist: Postoperativer Harnverhalt.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg BEACHTEN?

MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg darf nicht eingenommen werden

– wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Bethanecholchlorid oder einem der sonstigen Bestandteile von MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg sind.

– wenn Sie an Bronchialasthma, Hypotonie (niedriger Blutdruck), Hypertonie (hoher Blutdruck) oder Bradykardie (verlangsamter Puls unter 60 Schlägen pro Minute) sowie bestimmten Erkrankungen des Herzens (Koronare Herzkrankheit, AV-Überleitungsstörungen), Epilepsie (Fallsucht) oder Parkinsonismus (Schüttellähmung), Störungen im Zusammenwirken der Blasenmuskulatur, wenn nicht zugleich eine wirksame Entspannung des Blasenschließmuskels vorhanden ist, kürzlich erfolgte Operationen im Harn- oder Magen-Darm-Trakt wegen der Gefahr einer Nahtinsuffizienz. Verschluss der Harnwege oder des Magen-Darm-Kanals, Überfunktion der Schilddrüse, Überwiegen des parasympatischen Nervensystems (Vagotonie), Bauchfellentzündung sowie Magen-/Darmgeschwüre leiden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg ist erforderlich, falls Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Medikamente (auch selbstgekauft!) einnehmen!

Kinder

Die Anwendung bei Kindern wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Erfahrungen in der Behandlung von Kindern vorliegen.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte keine Einnahme erfolgen, da Bethanecholchlorid möglicherweise Wehen auslösen und in die Muttermilch übertreten kann.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Wirkung nachfolgend genannter Arzneistoffe bzw. Präparategruppen kann bei gleichzeitiger Behandlung mit MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg beeinflusst werden:

Anticholinergika (Stoffe, die den Effekt der körpereigenen Substanz Acetylcholin verringern wie z.B. Atropin) sowie Chinidin oder Procainamid vermindern die Wirkung von MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg.

Cholinesterasehemmstoffe (Stoffe, die den Abbau der körpereigenen Substanz Acetylcholin hemmen) verlängern die Wirkung von MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg.

Die gleichzeitige Anwendung von Ganglienblockern kann zu einem kritischen Blutdruckabfall führen, dem meist schwere Bauchbeschwerden vorausgehen.

3. WIE IST MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Zum Einnehmen

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Einzeldosis für Erwachsene 1–2 Tabletten (entsprechend 25–50 mg Bethanecholchlorid). Diese soll bis zu 4 mal täglich eingenommen werden, was einer maximalen Tagesdosis von 8 Tabletten (entsprechend 200 mg Bethanechol) entspricht. Die Behandlung wird mit einer niedrigen Dosierung eingeleitet, die bis zum Erreichen der optimalen Wirkung gesteigert wird.

MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg sind mit etwas Flüssigkeit und vorzugsweise etwa eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit einzunehmen, um das Auftreten von Übelkeit zu vermeiden.

Exakte zeitliche Grenzen der Anwendungsdauer können nicht gesetzt werden. Sie hängen sowohl vom Krankheitsbild als auch von der individuellen Verträglichkeit ab. Nach Abklingen des Krankheitszustandes sollten MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg abgesetzt werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg eingenommen haben, als Sie sollten, kontaktieren Sie so schnell wie möglich einen Arzt.

Eine Überdosierung ist durch Symptome wie Übelkeit, Magen-/Darmkrämpfe, Harndrang, unwillkürliche Blasen- und Darmentleerung, Schwitzen, Blutdruckabfall bis zum Schock, Störungen der Herzfunktion, Asthma, erschwertes Atmen mit bronchialer Sekretion oder starker Speichelfluß gekennzeichnet.

Wenn Sie die Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg vergessen haben,

so sollten Sie auf die vom Arzt verordnete Menge übergehen. Eine vergessene Einzeldosis darf jedoch nicht durch eine doppelte Einzeldosis beim nächsten Einnahmezeitpunkt ausgeglichen werden.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

sehr häufig	mehr als 1 von 10 Behandelten
häufig	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
gelegentlich	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
selten	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
sehr selten	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Allgemein:

Sehr häufig: Verstärkung von Speichel- und Schweißbildung.

Häufig: Herabsetzung der Körpertemperatur (Hypothermie).

Sehr selten: Schmerzen in der Brust, Hitze- und Spannungsgefühl, Kopfschmerzen.

Herz-Kreislaufsystem:

Häufig: verlangsamter Puls unter 60 Schlägen pro Minute (Bradykardie), Blutdruckabfall.

Selten: Besonders zu Beginn der Behandlung können plötzliche Änderungen der Körperhaltung aus dem Sitzen oder Liegen zu Schwindelanfällen oder Benommenheit führen (orthostatische Hypotonie).

Verdauungstrakt:

Häufig: Durchfall.

Gelegentlich: Übelkeit und Erbrechen, Beschwerden im Magen-Darm-Bereich.

Sehr selten: Aufstoßen, Bildung von Magen-/Darmgeschwüren.

Harnableitendes System:

Sehr häufig: verstärkter Harndrang.

Sinnesorgane:

Sehr selten: verstärkter Tränenfluß, Schleiersehen, Veränderung der Anpassungsfähigkeit der Augen.

Atemwege:

Sehr selten: besonders bei Patienten mit Neigung zu Atembeschwerden: Krämpfe der Bronchialmuskulatur, erschwertes Atmen, Atempfeifen.

Haut und Hautanhangsgebilde:

Sehr häufig: Rötung der Haut.

Sehr selten: Hautausschlag (Miliaria cristallina).

Bei Nebenwirkungen konsultieren Sie bitte so bald wie möglich Ihren Arzt und besprechen Sie mit ihm die eventuell erforderlichen Gegenmaßnahmen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. WIE IST MYOCHOLINE-GLENWOOD® Tabletten 25 mg AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Trocken und nicht über 25° C lagern.

Stand der Information:

Januar 2010