

## GBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

# Aknemycin® Lösung

Erythromycin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Aknemycin Lösung und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aknemycin beachten?
3. Wie ist Aknemycin anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aknemycin aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST AKNEMYCIN LÖSUNG UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Aknemycin Lösung ist ein Erythromycin-Externum spezifisch gegen Akne.

Der Wirkstoff Erythromycin dringt in die Talgdrüsenausführungsgänge der Haut ein und entfaltet dort seine Wirkung speziell gegen Bakterien, die bei der Entstehung der Akne von Bedeutung sind.

Die alkoholische Grundlage unterstützt die antibakterielle Wirkung des Erythromycins und löst darüber hinaus den bei Akne übermäßig auftretenden Hauttalg.

Aknemycin wird angewendet bei allen Formen der Akne, insbesondere bei entzündlichen Formen mit Knötchen (Papeln) und Eiterbläschen (Pusteln).

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON AKNEMYCIN BEACHTEN?

**Aknemycin darf nicht angewendet werden, wenn Sie**

- überempfindlich (allergisch) gegen Erythromycin oder einen der sonstigen Bestandteile von Aknemycin sind.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Aknemycin ist erforderlich**

- bei Anwendung im Gesicht. Vermeiden Sie, dass Aknemycin in die Augen gelangt.

**Bei der Anwendung von Aknemycin mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bislang nicht bekannt.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

*Schwangerschaft*

Wenn Sie schwanger sind, können Sie Aknemycin anwenden, da der enthaltene Wirkstoff Erythromycin in keinem nennenswerten Maß über die Haut in den Blutkreislauf aufgenommen wird und daher unerwünschte Wirkungen auf das ungeborene Kind nicht zu erwarten sind.

*Stillzeit*

Wenn Sie stillen, können Sie Aknemycin anwenden. Vermeiden Sie jedoch den Kontakt des Mundes des Säuglings mit den behandelten Körperstellen.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### 3. WIE IST AKNEMYCIN ANZUWENDEN?

Wenden Sie Aknemycin immer genau nach der Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:


Tragen Sie Aknemycin zweimal täglich sparsam auf die betroffenen Hautstellen auf.

*Art der Anwendung:*

Die Flasche hat einen speziellen Applikator; damit kann Aknemycin direkt auf die Haut aufgetragen werden.



Und so machen Sie die Applikatorflasche gebrauchsfertig: Drücken Sie vor jeder Benutzung mit der umgekehrten Verschlusskappe einmal kräftig auf den Applikator (siehe Zeichnung). Hierdurch wird die Sicherung entriegelt und Aknemycin kann aufgetragen werden.



**Dauer der Anwendung:**

Die Therapie mit Aknemycin sollte nicht länger als 4 - 6 Wochen dauern.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Aknemycin zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie die Anwendung von Aknemycin abbrechen**

Wenden Sie sich immer an Ihren Arzt, wenn Sie die Behandlung abbrechen möchten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Aknemycin Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 Behandler von 10
<b>Häufig:</b>	1 bis 10 Behandelte von 100
<b>Gelegentlich:</b>	1 bis 10 Behandelte von 1.000
<b>Selten:</b>	1 bis 10 Behandelte von 10.000
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 Behandler von 10.000
<b>Nicht bekannt:</b>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

**Mögliche Nebenwirkungen:**

Sehr selten: Austrocknung, Rötung, Brennen und Juckreiz der Haut.

In sehr seltenen Fällen können diese Beschwerden auch Ausdruck einer Überempfindlichkeitsreaktion gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von Aknemycin sein (allergisches Kontaktekzem).

Nach längerer Behandlung kann es zu einer Befundverschlechterung durch Resistenzentwicklung (Unempfindlichkeit von Bakterien) und Hautentzündungen durch bestimmte Bakterien kommen.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen ist die Fortsetzung der Behandlung mit weniger austrocknenden Erythromycin-Zubereitungen (Salbe, Emulsion) angebracht. Die Aknemycin Lösung kann auch im Wechsel mit diesen Zubereitungen aufgetragen werden.

**5. WIE IST AKNEMYCIN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 25 °C lagern.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch**

Verwenden Sie Aknemycin nach dem ersten Öffnen der Flasche nicht länger als 6 Monate.

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was Aknemycin enthält**

Der Wirkstoff ist: Erythromycin.

10 g Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten 0,2 g Erythromycin.

Die sonstigen Bestandteile sind:

9,25 g Ethanol; Tris[dodecylpoly(oxethyl)-4]phosphat; Glycerol; Povidon K 30.

**Wie Aknemycin aussieht und Inhalt der Packung**

Aknemycin ist eine klare, farblose Lösung.

Aknemycin ist in Packungen mit 25 ml und 50 ml Lösung erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Almirall Hermal GmbH, Scholtzstraße 3, 21465 Reinbek

Telefon: (040) 72704-0, Telefax: (040) 7229296

info@almirall.de, www.almirall.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2008.**

