

## Gebrauchsanweisung

# MOVICOL® Junior aromafrei

6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen



**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Medizinprodukts beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an den Arzt oder Apotheker.
- Dieses Medizinprodukt wurde dem Kind persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie das Kind.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen das Kind erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, informieren Sie bitte den Arzt oder Apotheker.

### Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

1. Was ist Movicol Junior aromafrei und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Movicol Junior aromafrei beachten?
3. Wie ist Movicol Junior aromafrei anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Movicol Junior aromafrei aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. Was ist Movicol Junior aromafrei und wofür wird es angewendet?

Der Name dieses Produkts ist Movicol Junior aromafrei 6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Es handelt sich um ein Produkt aus der Gruppe der Laxanzien zur Behandlung von Verstopfung bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren und zur Behandlung einer hartnäckigen Verstopfung mit Kotstauung im Darm, „Koprostase“ genannt, bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren. Für Jugendliche ab 12 Jahren stehen andere Movicol-Produkte zur Verfügung.

Movicol Junior aromafrei verhilft dem Kind zu einer komfortablen Darmtätigkeit, selbst wenn es bereits seit längerer Zeit an Verstopfung leidet.

### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Movicol Junior aromafrei beachten?

Movicol Junior aromafrei darf nicht verabreicht werden, wenn der Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass das Kind an einer der folgenden Erkrankungen leidet:

- Darmverengung oder Darmverschluss
  - bei vorliegendem Darmdurchbruch (Perforation)
  - schwere entzündliche Darmerkrankung wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder toxisches Megakolon
  - Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile
- Wenn das Kind an einer Herz- oder Nierenerkrankung leidet, einen eingeschränkten Würgereflex oder eine Reflux-Ösophagitis hat (Sodbrennen aufgrund von Rückfluss des Mageninhalts in die Speiseröhre), sollten Sie vor der Verabreichung von Movicol Junior aromafrei den Arzt befragen.

### Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Movicol Junior aromafrei:

- Bei der Einnahme mit anderen Produkten

Die Wirksamkeit einiger Arzneimittel, wie

beispielsweise Antiepileptika, kann während der Einnahme von Movicol Junior aromafrei verringert sein. Informieren Sie den Arzt, wenn das Kind Arzneimittel einnimmt.

Bei der Einnahme großer Mengen von Movicol Junior aromafrei (z. B. bei Kotstau (Koprostase)), sollte das Kind innerhalb einer Stunde vor oder nach der Einnahme von Movicol Junior aromafrei keine Arzneimittel einnehmen.

### 3. Wie ist Movicol Junior aromafrei anzuwenden?

Um eine gute Gesundheit, einschließlich eines gesunden Darms, zu erhalten, wird empfohlen, dem Kind jeden Tag eine ausreichende Menge Flüssigkeit zu geben.

Dieses Medizinprodukt kann jederzeit und unabhängig von Nahrungsmitteln oder Getränken verabreicht werden.

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

### Verstopfung

Die Dosierung von Movicol Junior aromafrei hängt vom Alter des Kindes und seinem Ansprechen auf die Behandlung ab.

Alter (Jahre)	Anzahl an Beuteln Movicol Junior aromafrei
Kinder 2 – 6 Jahre	1 Beutel pro Tag
Kinder 7 – 11 Jahre	2 Beutel pro Tag

Auf Anraten des Arztes kann die Anzahl der Beutel erhöht werden, bis das Kind einen weichen Stuhlgang hat. Hierzu sollte normalerweise die Einnahme von nicht mehr als vier Beuteln täglich ausreichen.

Es ist nicht erforderlich, die Lösung auf einmal zu trinken. Wenn das Kind es vorzieht, kann die eine Hälfte der Lösung morgens und die andere Hälfte abends eingenommen werden.

### Kotstau (Koprostase):

Bevor das Kind Movicol Junior aromafrei zur Behandlung der Koprostase (Kotstau) einnimmt, sollte medizinisch abgeklärt sein, dass das Kind auch tatsächlich an dieser Krankheit leidet.

Der Verlauf einer Behandlung mit Movicol Junior aromafrei ist wie folgt:

Anzahl der Beutel von Movicol Junior aromafrei							
Alter (Jahre)	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Tag 7
5 - 11	4	6	8	10	12	12	12

Die Tagesdosis (Anzahl der Beutel) sollte in Einzeldosen innerhalb von 12 Stunden eingenommen werden (z. B. 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends). Die Behandlung kann eingestellt werden, sobald das Medizinprodukt gewirkt hat. Dies äußert sich darin, dass das Kind große Mengen von Stuhl und/oder wässrigem Durchfall absetzt.

### Herstellen der Lösung

Öffnen Sie den Beutel und geben Sie den Inhalt in ein Glas. Fügen Sie ¼ Glas (etwa 62,5 ml) Wasser hinzu. Rühren Sie so lange, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat und die Movicol Junior aromafrei-Lösung klar oder leicht trüb ist und geben Sie sie dem Kind zu trinken.

Wenn das Kind Movicol Junior aromafrei gegen Kotstau (Koprostase) einnimmt, kann es einfacher sein, alle 12 Beutel in 750 ml Wasser aufzulösen.

### Dauer der Anwendung:

### Verstopfung:

Die Behandlung von Kindern mit chronischer Verstopfung sollte über einen längeren Zeitraum, mindestens

6-12 Monate, erfolgen. Wenn dies erforderlich ist, fragen Sie bitte den Arzt.

#### **Kotstau (Koprostase):**

Die Dauer der Behandlung mit Movicol Junior aromafrei beträgt bis zu 7 Tage.

#### **Wenn das Kind eine größere Menge von Movicol Junior aromafrei eingenommen hat, als es sollte:**

Bei dem Kind kann es zu Durchfall kommen, welcher zu einer Austrocknung des Körpers führen kann. Falls dies eintritt, beenden Sie die Einnahme von Movicol Junior aromafrei und geben Sie ausreichend Flüssigkeit. Wenn Sie beunruhigt sind, wenden Sie sich an den Arzt oder Apotheker.

#### **Wenn Sie vergessen haben, Movicol Junior aromafrei zu verabreichen:**

Geben Sie die Dosis, sobald Sie sich daran erinnern.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Movicol Junior aromafrei kann Nebenwirkungen haben.

#### **Informieren Sie umgehend den Arzt und geben Sie kein Movicol Junior aromafrei mehr, wenn das Kind:**

- eine schwerwiegende allergische Reaktion bekommt, die Schwierigkeiten beim Atmen oder ein Anschwellen von Gesicht, Lippen, Zunge oder im Hals- und Rachenbereich auslöst.

#### **Sehr häufige Nebenwirkungen (mehr als einer von 10 Patienten):**

- Bauchschmerzen
- Darmgeräusche

#### **Häufige Nebenwirkungen (bei mehr als einem von 100, aber weniger als einem von 10 Patienten):**

- Durchfall
- Erbrechen
- Übelkeit
- Beschwerden im Analbereich (unangenehmes Gefühl am After)

Wenn das Kind gegen chronische Verstopfung behandelt wird, wird sich der Durchfall im Allgemeinen verbessern, wenn die Dosis reduziert wird.

#### **Gelegentliche Nebenwirkungen (bei mehr als einem von 1000, aber weniger als einem von 100 Patienten):**

- Blähbauch
- Blähungen

#### **Seltene Nebenwirkungen (weniger als einer von 1000 Patienten):**

- allergische Reaktionen, die mit Atemlosigkeit oder Schwierigkeiten beim Atmen einhergehen können

Weitere Nebenwirkungen:

Hautausschlag, Juckreiz, Rötung der Haut oder Nesselsucht, geschwollene Hände, Füße oder Knöchel, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, verminderte oder erhöhte Kaliumkonzentration im Blut.

Wenn eine der oben genannten Nebenwirkungen zu erheblichen Beeinträchtigungen führt oder mehrere Tage andauert, oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, informieren Sie bitte den Arzt oder Apotheker.

#### **5. Wie ist Movicol Junior aromafrei aufzubewahren?**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Produkt nach dem auf dem Beutel und

auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Sie dürfen Movicol Junior aromafrei nicht über 25 °C lagern. Sobald Sie Movicol Junior aromafrei in Wasser aufgelöst haben und das Kind es nicht umgehend trinken kann, halten Sie es verschlossen und lagern Sie es im Kühlschrank (2-8 °C). Entsorgen Sie die Lösung, die nicht innerhalb von 24 Stunden verbraucht wurde.

#### **6. Weitere Informationen**

Jeder 6,9 g-Beutel Movicol Junior aromafrei Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen enthält:

Macrogol 3350	6,563 g
Natriumchlorid	0,1754 g
Natriumhydrogencarbonat	0,0893 g
Kaliumchlorid	0,0251 g

Movicol Junior aromafrei enthält keine Farb- oder Geschmacksstoffe oder Süßungsmittel.

Nach dem Herstellen einer Lösung mit ¼ Glas (62,5 ml) Wasser ergibt sich für jeden Beutel:

Natrium	65 mmol/l
Chlorid	53 mmol/l
Kalium	5,4 mmol/l
Hydrogencarbonat	17 mmol/l

Movicol Junior aromafrei ist erhältlich in Kartons zu 30 und 90 Beuteln.



Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam  
Niederlande

#### **Vertrieb durch:**

Norgine GmbH

Im Westpark 14, 35435 Wettenberg

Tel. 0641 / 98 497 0

Fax 0641 / 33 055 900

Internet: [www.norgine.de](http://www.norgine.de)

E-mail: [Info@norgine.de](mailto:Info@norgine.de)



Norgine sammelt aktiv Rückmeldungen zu ihren Produkten und deren Gebrauch. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und teilen Sie uns auf [www.movicol.de](http://www.movicol.de) Ihre Erfahrungen bei der Anwendung von Movicol Junior aromafrei mit.

Falls Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Sie das Unternehmen kontaktieren möchten, das Movicol Junior aromafrei herstellt, wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse, wo man Ihnen gern weiterhelfen wird.

#### **Stand der Information: April 2018**

MOVICOL, NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.



Bei beschädigter  
Verpackung nicht  
verwenden.