

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Blopess 32 mg

Tabletten

Candesartancilexetil

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Blopess 32 mg Tabletten

Anwendung bei Kindern

Es gibt keine Erfahrungen mit der Anwendung von Blopess bei Kindern (unter 18 Jahren). Daher sollte Blopess nicht an Kinder gegeben werden.

Bei Einnahme von Blopess mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor Kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Blopess kann die Wirkung einiger anderer Arzneimittel beeinflussen, und einige Arzneimittel können einen Einfluss auf Blopess haben. Wenn Sie bestimmte Arzneimittel einnehmen, wird Ihr Arzt eventuell von Zeit zu Zeit Blutuntersuchungen durchführen müssen.

Informieren Sie Ihren Arzt insbesondere, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen:

- Andere Arzneimittel, die helfen, ihren Blutdruck zu senken, einschließlich Betablocker, Diazoxid und ACE-Hemmer wie Enalapril, Captopril, Lisinopril oder Ramipril.
- Nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimittel (NSARs) wie Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Celecoxib oder Etoricoxib (Arzneimittel zur Linderung von Schmerz und Entzündung).
- Acetylsalicylsäure (wenn Sie mehr als 3 g pro Tag einnehmen) (Arzneimittel zur Linderung von Schmerz und Entzündung)
- Kaliumpräparate oder kaliumhaltige Salzersatzmittel (Arzneimittel, die die Menge an Kalium in Ihrem Blut erhöhen).
- Heparin (ein Arzneimittel zur Blutverdünnung).
- Entwässerungstabletten (Diuretika).
- Lithium (ein Arzneimittel gegen psychische Erkrankungen).

Bei Einnahme von Blopess zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken (insbesondere Alkohol)

- Sie können Blopess mit oder ohne Nahrung einnehmen.
- Wenn Ihnen Blopess verschrieben wird, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Alkohol trinken. Alkohol kann bei Ihnen ein Gefühl der Ohnmacht oder Schwindel hervorrufen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie vermuten, schwanger zu sein (oder schwanger werden könnten). In der Regel wird Ihr Arzt Ihnen empfehlen, Blopess vor einer Schwangerschaft bzw. sobald Sie wissen, dass Sie schwanger sind, abzusetzen, und er wird Ihnen ein anderes Arzneimittel empfehlen. Die Anwendung von Blopess in der frühen Schwangerschaft wird nicht empfohlen und Blopess darf nicht mehr nach dem dritten Schwangerschaftsmonat eingenommen werden, da die Einnahme von Blopess in diesem Stadium zu schweren Schädigungen Ihres ungeborenden Kindes führen kann.

Stillzeit

Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie stillen oder mit dem Stillen beginnen wollen. Blopess wird nicht zur Anwendung bei stillenden Müttern empfohlen; Ihr Arzt kann eine andere Behandlung für Sie wählen, wenn Sie stillen wollen, vor allem, solange Ihr Kind im Neugeborenenalter ist oder wenn es eine Frühgeburt war.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Einige Personen können sich während der Einnahme von Blopess müde oder schwindelig fühlen. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, führen Sie kein Fahrzeug bzw. bedienen Sie keine Werkzeuge oder Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Blopess

Blopess enthält Lactose, eine Zuckerart. Wenn Ihnen von Ihrem Arzt mitgeteilt wurde, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

3. WIE IST BLOPRESS EINZUNEHMEN?
Nehmen Sie Blopess immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Es ist wichtig, Blopess jeden Tag einzunehmen. Sie können Blopess mit oder ohne Nahrung einnehmen. Schlucken Sie die Tablette mit einem Schluck Wasser. Versuchen Sie die Tablette jeden Tag zur gleichen Zeit einzunehmen. Dies wird Ihnen helfen, sich daran zu erinnern, sie zu nehmen.

Bluthochdruck:

- Die übliche Dosis von Blopess ist 8 mg einmal täglich. Je nach Ansprechen des Blutdrucks kann Ihr Arzt diese Dosis auf 16 mg einmal täglich und weiter auf bis zu 32 mg einmal täglich erhöhen.
- Bei einigen Patienten, wie z. B. solchen mit Leber- oder Nierenproblemen oder jenen, die vor Kurzem Körperflüssigkeiten verloren haben, z. B. durch Erbrechen oder Durchfall oder aufgrund der Anwendung von Entwässerungstabletten, kann der Arzt eine niedrigere Anfangsdosis verschreiben.
- Einige Patienten mit schwarzer Hautfarbe können, bei alleiniger Behandlung mit dieser Art von Arzneimitteln, ein vermindertes Ansprechen des Blutdrucks haben, und diese Patienten benötigen eventuell eine höhere Dosis.

Herzleistungsschwäche:

- Die übliche Anfangsdosis von Blopess ist 4 mg einmal täglich. Ihr Arzt kann Ihre Dosis durch Verdopplung der Dosis in Intervallen von mindestens 2 Wochen bis auf 32 mg einmal täglich erhöhen. Blopess kann zusammen

mit anderen Arzneimitteln gegen Herzleistungsschwäche eingenommen werden, und Ihr Arzt wird entscheiden, welche Behandlung für Sie geeignet ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Blopess eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Blopess eingenommen haben, als Ihnen von Ihrem Arzt verschrieben wurde, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Arzt oder Apotheker, um Rat zu erhalten.

Wenn Sie die Einnahme von Blopess vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um eine vergessene Tabletteneinnahme nachzuholen. Nehmen Sie die nächste Dosis einfach wie üblich ein.

Wenn Sie die Einnahme von Blopess abbrechen
Wenn Sie die Einnahme von Blopess abbrechen, kann Ihr Blutdruck erneut ansteigen. Brechen Sie daher die Einnahme von Blopess nicht ab, ohne zuerst mit Ihrem Arzt zu sprechen. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Produkts haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
Wie alle Arzneimittel kann Blopess Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Wichtig ist, dass Sie sich dieser möglichen Nebenwirkungen bewusst sind.

Nehmen Sie Blopess nicht weiter ein und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie eine der folgenden allergischen Reaktionen haben:

- Schwierigkeiten beim Atmen mit oder ohne Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge und/oder Rachen
- Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge und/oder Rachen, die möglicherweise Schwierigkeiten beim Schlucken verursachen kann
- starker Juckreiz der Haut (mit pustelähnlichen Schwellungen)

Blopess kann zu einer Verminderung der Anzahl der weißen Blutkörperchen führen. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Infektionen kann verringert sein und Sie bemerken möglicherweise Müdigkeit, eine Infektion oder Fieber. Falls dies auftritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Möglicherweise wird Ihr Arzt gelegentlich Blutuntersuchungen durchführen, um zu überprüfen, ob Blopess bislang einen Einfluss auf Ihr Blut hatte (Agranulozytose). Andere mögliche Nebenwirkungen beinhalten:

Häufig (betrifft 1 bis 10 Anwender von 100)

- Schwindel/Drehgefühl.
- Kopfschmerzen.
- Atemwegsinfektion.
- Niedriger Blutdruck. Dieser kann bei Ihnen ein Gefühl von Ohnmacht oder Schwindel hervorrufen.
- Veränderungen bei Blutuntersuchungsergebnissen:
 - Eine erhöhte Menge an Kalium in Ihrem Blut, besonders wenn Sie bereits Nierenprobleme oder eine Herzleistungsschwäche haben. In schweren Fällen bemerken Sie möglicherweise Müdigkeit, Schwäche, unregelmäßigen Herzschlag oder Kribbeln („Ameisenlaufen“).
- Beeinflussung Ihrer Nierenfunktion, besonders wenn Sie bereits Nierenprobleme oder eine Herzleistungsschwäche haben. In sehr seltenen Fällen kann Nierenversagen auftreten.

Sehr selten (betrifft weniger als 1 Anwender von 10 000)

- Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge und/oder Rachen.
- Eine Abnahme Ihrer roten oder weißen Blutkörperchen. Möglicherweise bemerken Sie Müdigkeit, eine Infektion oder Fieber.
- Hautausschlag, beuliger Ausschlag (Nesselsucht).
- Juckreiz.
- Rückenschmerzen, Schmerzen in Gelenken und Muskeln.
- Veränderungen Ihrer Leberfunktion, einschließlich Leberentzündung (Hepatitis). Sie bemerken möglicherweise Müdigkeit, eine Gelbfärbung Ihrer Haut und des Weißén im Auge sowie grippeähnliche Beschwerden.
- Husten.
- Übelkeit.

• Veränderungen bei Blutuntersuchungsergebnissen:

- Eine erniedrigte Menge an Natrium in Ihrem Blut. In schweren Fällen bemerken Sie möglicherweise Schwäche, Energiemangel oder Muskelkrämpfe. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST BLOPRESS AUFZUBEWAHREN?

- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Durchdrückpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
- Nicht über 30° C lagern.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Blopess 32 mg enthält

- Der Wirkstoff ist Candesartancilexetil
 - 1 Tablette enthält 32 mg Candesartancilexetil
- Die sonstigen Bestandteile sind: Carmellose-Calcium, Hydroprolose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Maisstärke, Macrogol und Eisen(III)-oxid (E172)

Wie Blopess 32 mg aussieht und Inhalt der Packung:

Blopess 32 mg Tabletten sind hell rosa gefärbte, runde konvexe Tabletten mit der Gravur „32“ auf einer Seite und einer Bruchkerbe auf der anderen Seite.

Blopess 32 mg Tabletten sind in Blisterpackungen mit 28, 56, oder 98 Tabletten erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Importeur:
Einfuhr, Umpackung und Vertrieb: kohipharma GmbH, Im Holzhau 8, 66663 Merzig

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Mitgliedsstaat	Name
Österreich, Deutschland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich	Blopess
Frankreich	Kenzen
Spanien	Parapres
Vereinigtes Königreich	Amias

Blopess 32 mg Tabletten

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2013