

# Ciclopirox acis® 1 % Lösung

Wirkstoff: Ciclopirox-Olamin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Ciclopirox acis 1 % Lösung und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Ciclopirox acis 1 % Lösung beachten?
3. Wie ist Ciclopirox acis 1 % Lösung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ciclopirox acis 1 % Lösung aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST CICLOPIROX ACIS 1 % LÖSUNG UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Ciclopirox acis 1 % Lösung ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Pilzkrankungen der Haut (Breitspektrum-Antimykotikum). Der Wirkstoff Ciclopirox-Olamin wirkt pilzabtötend auf die meisten für Haut- und Schleimhauterkrankungen verantwortlichen Pilze.

Ciclopirox acis 1 % Lösung wird angewendet bei allen Pilzkrankungen der Haut.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON CICLOPIROX ACIS 1 % LÖSUNG BEACHTEN?

**Ciclopirox acis 1 % Lösung darf nicht angewendet werden**

- wenn sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Ciclopirox-Olamin oder einen der sonstigen Bestandteile von Ciclopirox acis 1 % Lösung sind.
- am Auge.
- wenn Sie stillen.

Ciclopirox acis 1 % Lösung ist nicht zur Anwendung im Gehörgang geeignet.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Ciclopirox acis 1 % Lösung ist erforderlich**

Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder sollten nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt mit Ciclopirox acis 1 % Lösung behandelt werden.

## Bei Anwendung von Ciclopirox acis 1 % Lösung mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/angewenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

## Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen mit der Anwendung bei schwangeren Frauen vor. Daher darf Ciclopirox acis 1 % Lösung während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn der Arzt schätzt den Nutzen für Mutter und Kind höher ein als mögliche Risiken.

Da nicht bekannt ist, ob Ciclopirox-Olamin in die Muttermilch übergeht, darf während der Dauer der Behandlung nicht gestillt werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

## Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Über die Einschränkung der Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen liegen keine Hinweise vor.

## 3. WIE IST CICLOPIROX ACIS 1 % LÖSUNG ANZUWENDEN?

Wenden Sie Ciclopirox acis 1 % Lösung immer genau nach der Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis**

Tragen Sie Ciclopirox acis 1 % Lösung in aller Regel 2x täglich auf die erkrankten Hautstellen auf und reiben sie diese leicht ein.

### Art und Dauer der Anwendung

Am besten bewährt hat sich die Anwendung nach dem Waschen, Duschen oder Baden. So wird die Lösung durch die Reinigung nicht gleich wieder entfernt und kann ausreichend lange einwirken.

Setzen Sie die Behandlung mit Ciclopirox acis 1% Lösung bis zum Abklingen der Hauterscheinungen (im Allgemeinen 2 Wochen) fort. Zur Vermeidung von Rückfällen wird empfohlen, die Behandlung darüber hinaus noch 1 - 2 Wochen weiterzuführen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Ciclopirox acis 1% Lösung zu stark oder zu schwach ist.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Ciclopirox acis 1% Lösung angewendet haben, als Sie sollten**

Sie können die Behandlung mit der Ihnen verordneten Dosis fortsetzen.

### **Wenn Sie die Anwendung von Ciclopirox acis 1% Lösung vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Führen Sie die Behandlung wie angegeben weiter.

### **Wenn Sie die Anwendung von Ciclopirox acis 1% Lösung abbrechen**

Bei einer vorzeitigen Beendigung der Behandlung besteht die Gefahr, dass Ihre Pilzkrankung wieder von vorne beginnt. Bitte beenden Sie die Behandlung erst dann, wenn Ihr Arzt die Heilung bestätigt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Ciclopirox acis 1% Lösung Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

### **Mögliche Nebenwirkungen**

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Ciclopirox acis 1% Lösung nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Vorübergehend kann es, auch bedingt durch den Alkoholgehalt der Lösung, zu Juckreiz und leichtem Brennen kommen. Diese Erscheinungen können auch Zeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sein.

Selten (1 bis 10 Behandelte von 10.000) tritt eine allergische Kontaktdermatitis auf, die sich durch Juckreiz, Rötung, Bläschen auch über das Kontaktareal hinaus (sogenannte Streureaktionen) manifestieren kann.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **5. WIE IST CICLOPIROX ACIS 1% LÖSUNG AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 30°C lagern.

Nach Anbruch nicht über 25°C lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Ciclopirox acis 1% Lösung ist nach Anbruch 4 Wochen haltbar.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Ciclopirox acis 1% Lösung enthält**

Der Wirkstoff ist Ciclopirox-Olamin.

1 ml Lösung enthält 10 mg Ciclopirox-Olamin.

### Die sonstigen Bestandteile sind:

Macrogol 400, 2-Propanol, gereinigtes Wasser.

### **Wie Ciclopirox acis 1% Lösung aussieht und Inhalt der Packung**

Ciclopirox acis 1% Lösung ist eine farblose, klare Lösung.

Ciclopirox acis 1% Lösung ist in Packungen mit 20 ml und 50 ml Lösung erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

acis Arzneimittel GmbH

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Telefon: 089 / 44 23 246 0

Telefax: 089 / 44 23 246 66

e-mail: info@acis.de

### **Hersteller**

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2011.**

---

**acis**<sup>®</sup>  
Arzneimittel