

# Aciclovir 800 - 1 A Pharma®

Wirkstoff: Aciclovir 800 mg pro Tablette

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* und wofür wird es eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* beachten?
3. Wie ist *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen



## 1. Was ist *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* und wofür wird es eingenommen?

*Aciclovir 800 - 1 A Pharma* ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Virusinfektionen (Virostatikum).

***Aciclovir 800 - 1 A Pharma* wird angewendet bei Gürtelrose (Herpes zoster)**

## 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* beachten?

***Aciclovir 800 - 1 A Pharma* darf nicht eingenommen werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Aciclovir, Valaciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* sind.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* ist erforderlich** (siehe „*Aciclovir 800 - 1 A Pharma* darf nicht eingenommen werden“ und „3. Wie ist *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* einzunehmen?“).

### Ältere Menschen

Bei älteren Menschen liegt häufiger als bei anderen Patienten eine Einschränkung der Nierenfunktion vor. Daher ist bei dieser Patientengruppe eine Überprüfung der Nierenfunktion zu empfehlen und verstärkt auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr bei der Einnahme der Tabletten zu achten. Gegebenenfalls wird der behandelnde Arzt eine Dosisanpassung vornehmen (siehe „3. Wie ist *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* einzunehmen?“).

**Bei Einnahme von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Cimetidin (Magen-Darm-Mittel) und Probenecid (Arzneimittel zur Behandlung von erhöhten Harnsäurespiegeln im Blut) verringern die Ausscheidung von Aciclovir, dem Wirkstoff von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma*, über die Nieren, was zu einer längeren Verweildauer von Aciclovir im Körper führen kann.

Aufgrund der großen therapeutischen Breite von Aciclovir ist eine Dosisanpassung jedoch nicht erforderlich.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Schwangerschaft

Sollte sich eine Behandlung in der Schwangerschaft als notwendig erweisen, so sind der Nutzen und die möglichen Risiken vom Arzt sorgfältig gegeneinander abzuwägen.

### Stillzeit

Nach Anwendung von Aciclovir-haltigen Arzneimitteln wurde Aciclovir in der Muttermilch gefunden. Deshalb soll während der Behandlung mit *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* nicht gestillt werden.

## Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Unter Anwendung von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* kann es zu Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Schwindel und Verwirrheitszuständen kommen. Dies kann Ihre Verkehrstüchtigkeit und Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen. Wenn diese Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten, fahren Sie nicht Auto und bedienen Sie keine gefährlichen Maschinen.

## 3. Wie ist *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* einzunehmen?

Nehmen Sie *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

### Erwachsene

Nehmen Sie 5-mal täglich 1 Tablette (800 mg Aciclovir) über den Tag verteilt in Abständen von 4 Stunden ein.

### Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion

Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, wie sie insbesondere bei älteren Menschen vermehrt auftreten kann, ist möglicherweise eine Anpassung der Aciclovir-Dosis erforderlich. Eine entsprechende Dosisanpassung wird gegebenenfalls von Ihrem Arzt vorgenommen.

### Art der Anwendung

Nehmen Sie die Tabletten unzerkaut möglichst nach den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) ein.

Bei eingeschränkter Nierenfunktion ist verstärkt auf eine angemessene Flüssigkeitszufuhr während der Behandlung zu achten.

### Besonderer Hinweis

Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte mit der Einnahme von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* so früh wie möglich, d. h. bei Auftreten der ersten Hauterscheinungen, begonnen werden.

### Dauer der Anwendung

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel 7-10 Tage.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* eingenommen haben als Sie sollten**

Vergiftungen sind nach Überdosierung von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* nicht zu erwarten. Nach einer auf einmal eingenommenen Dosis von 20 g Aciclovir traten keine Vergiftungserscheinungen auf. Eine versehentliche, wiederholte Überdosierung von oral eingenommenem Aciclovir über mehrere Tage war verbunden mit Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und Verwirrtheit.

Falls eine Überdosierung vorliegt und vermehrt Neben-

wirkungen auftreten oder Sie sich unsicher sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Aciclovir 800 - 1 A Pharma vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort (nehmen Sie die Tabletten z. B. nicht häufiger oder in größeren Mengen ein). Sollten Sie mehrfach die Einnahme vergessen oder zu wenig *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* eingenommen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Aciclovir 800 - 1 A Pharma abbrechen**

Selbst bei einer spürbaren Besserung Ihres Befindens sollten Sie die Behandlung mit *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* zu Ende führen, um den Heilungserfolg nicht zu gefährden.

Sollten Sie sich unsicher sein – z. B. wegen auftretender Nebenwirkungen – sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, bevor Sie eigenmächtig die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden!

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zu Grunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### **Mögliche Nebenwirkungen**

Nach Einnahme von Aciclovir-Tabletten wurden bisher folgende Nebenwirkungen gelegentlich beobachtet:

#### Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

*selten*: vorübergehende Verringerung der Anzahl bestimmter Blutzellen im Blutbild

#### Psychiatrische Erkrankungen

*gelegentlich*: Wahnvorstellungen (Halluzinationen)\*, Verwirrheitszustände\*

*Nicht bekannt*: vorübergehende Psychosen\*\*, Entfremdungserlebnisse, die nach Absetzen des Arzneimittels wieder verschwanden

#### Erkrankungen des Nervensystems

*gelegentlich*: Schläfrigkeit\*, Schwindel\*

*selten*: Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit

*Nicht bekannt*: Krampfanfälle\*\*

#### Erkrankungen der Atemwege, des Brustraumes und des Mittelfellraums

*selten*: Atembeschwerden

#### Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts

*gelegentlich*: Magen-Darm-Störungen wie Schmerzen im Oberbauch, Durchfall, Erbrechen und Übelkeit

#### Leber und Gallenerkrankungen

*selten*: vorübergehende Veränderungen bestimmter Laborwerte für die Leber (Bilirubin-, Leberenzym-Anstiege)

#### Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

*gelegentlich*: Hautausschläge, vermehrte Haarausdünnung (der Zusammenhang zwischen einem diffusen Haarausfall und der Einnahme von Aciclovir ist unklar)

#### Erkrankungen der Nieren und der Harnwege

*selten*: vorübergehende Veränderungen bestimmter Laborwerte für die Niere (Serumharnstoff- und Kreatinin-Anstiege)

\* Diese Nebenwirkungen, die nach Absetzen des Arzneimittels wieder verschwanden, traten für gewöhnlich bei Patienten mit geschädigter Nierenfunktion oder anderen Erkrankungen, die das Auftreten dieser unerwünschten Wirkungen begünstigten, auf.

\*\* insbes. beim Einsatz von Aciclovir als intravenöse Infusion bei komplizierten Krankheitsverläufen

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **5. Wie ist Aciclovir 800-1 A Pharma aufzubewahren?**

Arzneimittel, für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## **6. Weitere Informationen**

#### **Was Aciclovir 800 - 1 A Pharma enthält:**

Der Wirkstoff ist Aciclovir.

1 Tablette enthält 800 mg Aciclovir.

#### Die sonstige Bestandteile sind:

mikrokristalline Cellulose, Copovidon, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Carboxymethylstärke-Natrium Typ A (Ph.Eur.), hochdisperses Siliciumdioxid.

#### **Wie Aciclovir 800 - 1 A Pharma aussieht und Inhalt der Packung**

*Aciclovir 800 - 1 A Pharma* sind weiße, oblonge, bikonvexe Tabletten mit einer Bruchkerbe auf beiden Seiten.

*Aciclovir 800 - 1 A Pharma* ist in Originalpackungen mit 5, 25, 35, 50 und 100 Tabletten erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

#### Pharmazeutischer Unternehmer

**1 A Pharma GmbH**  
Keltenring 1 + 3  
82041 Oberhaching  
Telefon: 089/6138825 - 0

#### Hersteller

Salutas Pharma GmbH  
Otto-von-Guericke-Allee 1  
39179 Barleben

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet:** Dezember 2010

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf!

1 A Pharma GmbH wünscht gute Besserung!

#### **Zusätzliche Patienten-Information**

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie können zum Erfolg der Behandlung beitragen, wenn Sie die folgenden Hinweise beachten:

- Achten Sie während der Anwendung von *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
- Nehmen Sie *Aciclovir 800 - 1 A Pharma* so früh wie möglich nach dem Auftreten der ersten Anzeichen einer Infektion ein.
- Die Bläschen sind mit einer Virus-haltigen Flüssigkeit gefüllt. Vermeiden Sie die Berührung der Bläschen, da sich sonst die Infektion weiter ausbreiten kann oder Sie andere Personen anstecken können.